

LSD

ACID, BARTMAN, BART SIMPSON, MICRODOTS, GELATIN CHIPS, WINDOWPANES BLOTTER, PAPER BLOTTER

D-lysergic acid diethylamide, **LSD**, is the most potent hallucinogenic substance known. Usually taken orally, it is sold in tablets, capsules and, occasionally, as a liquid. LSD is often added to absorbent paper, which is divided into decorated pieces, each equivalent to one dose.

The effects of LSD are unpredictable depending on the amount you take, your personality, mood and expectations, as well as the surroundings where you are taking LSD. Usually, you feel the first effects within an hour after taking it. Effects can include dilated pupils, higher body temperature, increased heart rate and blood pressure, sweating, loss of appetite, sleeplessness, dry mouth and tremors. The “trips” typically begin to clear after about 12 hours.

Much more dramatic than the physical signs are changes in sensations and feelings. You may feel several different emotions at once or swing rapidly from one emotion to another. Depending on the dose, the drug can produce delusions and visual hallucinations, which can be frightening and cause panic. The experience with an adverse reaction—or bad trip—can last for about twelve hours. Terrifying thoughts and feelings, fear of insanity and death, injuries and fatal accidents can occur during states of LSD highs. Anyone can experience a bad trip—there is no way to predict what your own experience will be.

You may also experience flashbacks or recurrences of certain aspects of the drug experience. Flashbacks can occur suddenly and without warning, and may occur within a few days or more than a year after LSD use. In some cases, flashbacks can persist and cause significant distress or impairment in social or occupational functioning, a condition known as Hallucinogen-induced Persisting Perceptual Disorder.

LSD

ACIDO, GELATINA, PAPEL

D-lysergic acid diethylamide, **LSD**, es la sustancia alucinógena mas potente que se conoce. Usualmente se toma en forma oral, y es vendida en tabletas, capsulas, y ocasionalmente en liquido.

Los efectos del LSD son impredecibles. Depende de la cantidad que tomas, tu personalidad, ánimo, expectativas, como también los alrededores donde te encuentres cuando lo tomas. Usualmente los efectos se sienten después de una hora de haberlo tomado. Estos pueden incluir pupilas dilatadas, alta temperaturas, aumento de los latidos del corazón y presión sanguínea, transpiración, perdida del apetito, falta de sueño, bocas secas, trémulos. Los “viajes” típicamente comienzan a desvanecerse después de casi 12 horas.

Aun más dramático que los signos físicos son las sensaciones y los cambios de emociones. Puede ser que sientas diferente emociones al mismo tiempo, o puedes ir de emoción a emoción rápidamente. Depende de la dosis que tomas, la droga puede producir ilusiones visuales y alucinaciones las cuales pueden ser aterradoras y causen pánico. Las experiencias con estas reacciones adversas—o mal viaje- pueden durar hasta doce horas. Pensamientos y sentimientos aterradores, producen miedos de enloquecer y de morir. Heridas y accidentes fatales pueden ocurrir bajo la influencia de altas dosis de LSD. Cualquiera puede experimentar un mal viaje—no hay manera de predecir cual será tu propia experiencia.

También puedes experimentar regresiones, o repeticiones de ciertos aspectos de experiencias pasadas con la droga. Las regresiones pueden pasar repentinamente, sin ningún aviso, después de unos cuantos días o hasta un año después de haber usado LSD. En algunos, las regresiones pueden persistir y causar angustia intensa o incapacidad social o el mal funcionamiento ocupacional, una condición llamada Inducción- Alucinógena Persistente Perceptiva Desorden.