

Stimulants

RITALIN, ADDERAL AND DEXEDRINE KNOWN AS BENNIES, BLACK BEAUTIES, CROSSES, HEARTS, LA TURNAROUND, SPEED, TRUCK DRIVERS, UPPERS

STIMULANTS are prescribed for the treatment of only a few health conditions, including narcolepsy, ADHD and depression that has not responded to other treatments. They are swallowed and may be injected when abused.

Stimulants increase alertness, attention, and energy; they elevate blood pressure and increase heart rate and respiration. When abused, stimulants increase your blood pressure and heart rate, constrict blood vessels, increase blood glucose, and breathing.

As with other drugs, it is possible for you to become dependent upon or addicted to stimulants. Withdrawal symptoms include fatigue, depression, and disturbance of sleep patterns. Repeated use of some stimulants over a short period can lead to feelings of hostility or paranoia. Taking high doses of a stimulant may result in dangerously high body temperature and an irregular heartbeat. There is also the potential for heart attack or lethal seizures.

Injecting the drugs can also cause infections and the spread of diseases like HIV and hepatitis.

SOURCES: NIDA, U.S. DEA

For more information call 303.369.0039 x245
www.ImprovingHealthColorado.org
www.LinkinCare.org



Estimulantes

RITALIN, ADDERAL Y DEXEDRINE LLAMADOS BENNIES, NEGRAS, CRUCES, SPEED

LOS ESTIMULANTES son prescritos para el tratamiento de muy pocas condiciones de salud, incluyendo la narcolepsia, ADHD, y depresión cuales no han respondido a otros tratamientos. Son ingeridos y a veces inyectados cuando son abusados.

Los estimulantes aumentan el estar alerta, atención, y energía, como también eleva la presión sanguínea, los latidos del corazón, y la respiración. Cuando son abusados, los estimulantes aumentan la presión sanguínea, los latidos cardiacos, coarta los vasos sanguíneos, aumenta el azúcar en la sangre, y aumenta la respiración.

Como con otras drogas, es posible que te vuelvas dependiente o adicto a los estimulantes. Los síntomas de desintoxicación incluyen, fatiga, depresión, y disturbios en los patrones de dormir. El uso constante de algunos estimulantes durante corto tiempo te puede llevar a sentirte paranoico y/o ser hostil. Tomar dosis altas de estimulantes resulta en temperaturas corporales peligrosamente altas y latidos cardiacos irregulares. También existe el riesgo de un ataque cardiaco o una apoplejía letal.

Inyectarse la droga también puede causar infecciones y el contagio de infecciones como el HIV y la hepatitis.